


ЩО ТАКЕ РАК ШИЙКИ МАТКИ?



ЦЕ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНА ХВОРОБА, ГОЛОВНА ПРИЧИНА ЯКОЇ — ВПЛ (ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ)¹



У СВІТІ РАК ШИЙКИ МАТКИ
ЗАЙМАЄ 2-ГЕ МІСЦЕ У ЖІНОК,
ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ
ПУХЛИНИ⁴



КОЖЕН ДЕНЬ
В УКРАЇНІ ВІД
РАКУ ШИЙКИ
МАТКИ ГИНЕ
5 ЖІНОК³

ЯКА ПРИЧИНА РАКУ ШИЙКИ МАТКИ?



ВСІ ВИПАДКИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
ВИКЛИКАЄ ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)⁴


ЩО ТАКЕ ВПЛ?

ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ) — ЦЕ НАЗВА ГРУПИ ВІРУСІВ, ЯКІ **ДУЖЕ ПОШИРЕНІ**. ЦЕЙ ВІРУС ПЕРЕДАЄТЬСЯ ПІД ЧАС СТАТЕВОГО КОНТАКТУ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОНТАКТ «ШКІРА ДО ШКІРИ» В ІНТИМНИХ ЗОНАХ⁴



ВПЛ ДУЖЕ ПОШИРЕНИЙ

БІЛЬШІСТЬ СЕКСУАЛЬНО АКТИВНИХ ЖІНОК
ТА ЧОЛОВІКІВ БУДУТЬ ІНФІКОВАНІ ВПЛ
ПРОТЯГОМ ЇХ ЖИТТЯ⁴




У БІЛЬШОСТІ ЖІНОК ІНФІКУВАННЯ ВПЛ
МИНАЄ БЕЗСЛІДНО, АЛЕ, В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ,
НАСЛІДКОМ ВПЛ-ІНФЕКЦІЇ Є ПОЯВА
**АТИПОВИХ КЛІТИН НА ШИЙЦІ
МАТКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБУМОВИТИ
ВИНИКНЕННЯ РАКУ⁴**

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ВПЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА РАК ШИЙКИ МАТКИ?


Немає специфічних проявів ВПЛ-інфекції до моменту розвитку спричинених нею захворювань – дисплазії або раку шийки матки.⁴

Симптоми раку шийки матки проявляються переважно на пізніх стадіях.

СИМПТОМИ МОЖУТЬ ВКЛЮЧАТИ:^{4*}



Нерегулярні кровотечі у міжменструальний період чи після статевого акту



Біль у спині, нижніх кінцівках чи внизу живота



Слабкість, втрата ваги та зниження апетиту



Неприємний запах із піхви



Набряк однієї із нижніх кінцівок

*Ці симптоми не є специфічними ознаками раку шийки матки.

Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у Вас є один чи декілька із цих симптомів.

ЯК МОЖНА ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ВПЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА РАКУ ШИЙКИ МАТКИ?



РАК ШИЙКИ МАТКИ МОЖЕ БУТИ ДІАГНОСТОВАНИЙ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЗАВДЯКИ РЕГУЛЯРНОМУ СКРИНІНГУ. Під час скринінгу найбільш поширеною методикою є дослідження мазка по Папаніколау (ПАП-мазка).⁴



СКРИНІНГ МОЖЕ ДОПОМОГТИ ЗНАЙТИ АТИПОВІ КЛІТИНИ, ЯКІ ВИКЛИКАВ ВПЛ, ЦЕ НА РАННІХ ЕТАПАХ.⁴



ВАКЦИНАЦІЯ МОЖЕ ПОПЕРЕДИТИ ВИНИКНЕННЯ БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ДИСПЛАЗІЇ) ТА РАКУ ШИЙКИ МАТКИ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ВПЛ-ІНФЕКЦІЄЮ.³

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ РАЗОМ ВАКЦИНАЦІЮ ТА СКРИНІНГ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ.⁴

ЩО ДАЛІ?



ДОПОМОЖІТЬ ЗАХИСТИТИ СВОЮ ДОНЬКУ ТА СЕБЕ ВІД РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ ВПЛ ТА РОЗВИТКУ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ — ПОСПІЛКУЙТЕСЯ ІЗ ЛІКАРЕМ ВЖЕ СЬОГОДНІ!



1. Доступно за посиланням: <http://www.hpvinfos.ru/papillomavirus/papillomavirus-history.html>

(Дата останнього відвідування: 03.12.2019)

2. БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ №20 http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/index.htm

(Дата останнього відвідування: 04.12.2019)

3. Human papillomavirus (HPV) <https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/hpv.pdf> (Дата останнього відвідування: 04.12.2019)

4. World Health Organization (WHO). Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer.

[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-\(hpv\)-and-cervical-cancer](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer) (Дата останнього відвідування: 04.12.2019)

За сприяння ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна». За додатковою інформацією звертайтеся до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, Київ, проспект Павла Тичини, 1-В. www.ua.gsk.com.

Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 585-51-85 або на email oaх70065@gsk.com, повідомити про скаргу на якість препарату за тел. (044) 585-51-85 або +380 (50) 381-43-49, або на e-mail ua.complaints@gsk.com.

Вакцинація можлива тільки на підставі рекомендацій Вашого лікаря. Перед проведенням вакцинації обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Для отримання більш детальної інформації про вакцинацію або захворюваннях зверніться до Вашого лікаря. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.